

Vorter

Vorter skyldes et virus Human Papilloma Virus (HPV), der kun smitter mennesker. Der kan gå måneder fra man bliver smittet til vorten viser sig på huden. Vorter viser sig oftest på fødder eller hænder, men kan forekomme på hele kroppen. Vorter smitter ved berøring af vorten eller via de virusholdige afstødte hudceller.

Der er øget smitterisiko hvis:

- Der er rifter i huden
- Huden er opblødt af vand/sved
- Ved sygdom som fx influenza, hvor immunforsvaret er nedsat
- Hvis man piller eller bider i vorterne, kan man føre smitten videre til andre steder på kroppen.

Man kan nedsætte smitterisikoen ved at:

- Holde vorten dækket af vortemiddel, der kan købes på apoteket.
- Bruge badesko
- Have god hygiejne generelt

Fremgangsmåde

Vorter kan ved hjælp af forskellige behandlinger fjernes helt.

1. Vorten beskæres uden bedøvelse og fryses, til slut pensles med trichloreddikesyre (TCA).
2. Efterfølgende hjemmebehandling: Fodbad i 10 min., beskæring af vorten og behandling med Vortex-creme ca. hver 2. dag. Hvis huden bliver meget irriteret, holdes pause i behandlingen.

Obs!

- Hvis du er gravid eller har diabetes må Vortex-creme ikke benyttes, da anvendes i stedet Verucid-creme.
- Der kan forekomme smerter og eventuel blæredannelse efter behandling, dette er helt normalt. Opløsningen er stærkt lokalirriterende.

Links

- <http://www.dds.nu/wp-content/uploads/2012/07/vorter.pdf>
- <http://sundhedsstyrelsen.dk/~media/F7170A24EE7748F195F0AE00F63F5AC1.ashx>