

# Plaquenil og lignende lægemidler, herunder hydroxychloroquin

Plaquenil er et middel mod hudsygdomme samt malaria og leddegigt.

## Virksomme stoffer:

Hydroxychloroquin.

## Anvendelse

Midlet bruges til behandling af hudsygdomme i bindevævet, hududslæt efter lyspåvirkning samt enkelte andre sjældne hudsygdomme.

## Dosering ved lysudslæt samt hudens bindevævssygdomme:

2 - 4 tabletter i døgnet. Tabletter tages kun i perioder med aktiv hudsygdom.

## Forsigtighedsregler:

Husk altid at bruge solfaktor creme, når du spiser tabletterne, da huden kan blive følsom for sollys. Du skal oplyse lægen om du er gravid eller ammer, da tabletterne kan påvirke dit barn.

## Bivirkninger

Hyppige (<10 %): Træthed. Kvalme, mavesmerter, oppustethed. Hovedpine, følelsesmæssig ustabilitet, svimmelhed. Hudkløe, hududslæt. Uskarpt syn, hævelse af hornhinden, dobbeltsyn, uklar linse. Mindre hyppige: Diarré, nedsat appetit. Hårtab, pigmentforandringer. Nethindeforandringer i øjet, øresusen. Sjældne: Sygdom i hjertemuskulaturen. Påvirkning af knoglemarven med øget tendens til infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, træthed og svimmelhed pga. mangel på røde blodlegemer og øget tendens til blødninger pga. mangel på blodplader. Muskelsygdom. Krampesygdom, nervebetændelse, psykoser. Nældefeber. Allergisk hævelse i ansigtet, mundhulen og strubehovedet. Høretab, synsforstyrrelser. Meget sjældne: Alvorlig leversvigt, leverpåvirkning. Muskelsammentrækninger i luftrørene. Alvorlig hudsygdom, overfølsomhed over for lys. Ved langtidsbehandling kan nethinden beskadiges, så synet nedsættes.

**Overfølsom for quinin:** så skal du ikke tage Plaquenil.

## Kontroller:

Øjenlæge kontrol inden tabletter tages. Hudlæge kontrol en gang hver anden måned. Blodprøvekontrol inden behandling begynder og derefter en gang hver måned.

## Anden sygdom og anden medicin:

Det er vigtigt at du oplyser lægen om du har psoriasis, som kan blive forværret af Plaquenil. Den medicin du bruger skal du oplyse lægen om, da Plaquenil og tilsvarende lægemidler kan påvirke virkningen af anden medicin.