

Terbinafin

Tabletter bruges til behandling af svampeinfektion i hud og negle hos både voksne og børn. Virker ved at ødelægge svampenes cellevægge, så de går til grunde.

De forhandles også under navnet Lamisil®

Bivirkninger:

Meget almindelige (over 10%): Nedsat appetit, mæthedsfornemmelse. Kvalme, mavesmerter, diarré. Nældefeber, hududslæt.

Almindelige (1-10%) : Ledsmarter, muskelsmerter. Hovedpine.

Ikke almindelige (0,1-1%) : Smagsforstyrrelser.

Sjældne (0,01-0,1%): Påvirkning af leverens funktion, tilstopning af galdevejene. Ændring i hudens følesans.

Meget sjældne (under 0,01%): Alvorlig leversvigt. Øget tendens til infektioner pga. mangel på hvide blodlegmer, øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader. Alvorlig hudreaktion. Alvorlig allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper (chok), bindevævssygdom.

Ukendt hyppighed: Leverbetændelse, gulsot, tilstopning af galdevejene. Depression (som følge af smagsforstyrrelser). Øresusen (tinnitus).

Særlige advarsler: Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer og lever. Forsigtighed ved brugen af lægemidlet, hvis du har psoriasis eller alvorlige hudsygdomme, da der i meget sjældne tilfælde er set forværring af disse tilstande under behandling med Terbinafin tabletter.

Blodprøver ved længere tids (> 6 uger) behandling med Terbinafin tabletter :

Du skal tage blodprøve før behandlingen påbegyndes, og derefter igen efter 4 uger, mens du bliver behandlet. Din leverfunktion bliver målt. Du tager blodprøverne som klinikken har rekvireret over nettet og ringer efter to dage til klinikken for svar. Efter endt behandling tages også en blodprøve.

Brug af anden medicin: Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning: Kan om nødvendigt anvendes.