

Erythromycin tabletter

Handelsnavne: Erycin, Abbocitin, Hexabotin m.fl.

Antibiotikum, som hyppigt kan bruges i stedet for penicillin. Enterotabletter, som ikke tåler at deles over inden de indtages, de skal synkes hele.

Bruges normalt til infektioner forårsaget af visse bakterier infektioner i luftvejene, hud - og andre væv. Lægemidlet bruges også til behandling af akne og rosacea. I sidstnævnte tilfælde er behandlingen ofte af flere uger til måneders varighed.

Ved allergi overfor erythromycin må stoffet ikke bruges.

Det er vigtigt at du oplyser om al den medicin du anvender, da erythromycin påvirker virkningen af en del anden medicin.

Forsigtighedsregler:

Erythromycin udskilles hovedsageligt via leveren. Forsigtighed ved nedsat leverfunktion.

Bivirkninger

Meget almindelige (over 10%): Nedsat appetit. Kvalme, opkastning, abdominalsmerter, diarré.

Almindelige (1-10%): Forhøjede levertal, forhøjet galdestof. Hududslæt.

Ikke almindelige (0,1-1%): Nældefeber.

Sjældne (0,01-0,1%): Leverbetændelse, bugspytkirtel betændelse. Hjertesygdom med forlænget elektrisk QT-interval i hjertet, pas på !! Anafylaktisk reaktion. Nedsat hørelse.

Meget sjældne (under 0,01%): Svær tarmbetændelse. Svær hudsygdom.

Erythromycin bør undgås, når man tager en af nedenfor nævnte lægemidler, da samtidig indtag af begge kan give svære bivirkninger, idet Erythromycin øger blodkoncentrationen af følgende lægemidler, som altså bør undgås sammen med erythromycin:

buspiron, carbamazepin, ciclosporin, felodipin, glukokortikoider, lovastatin, midazolam, simvastatin, tacrolimus, theophyllin og triazolam, diltiazem, fluconazol, itraconazol, ketoconazol og verapamil pga. hæmmet omsætning i leveren.

Ved samtidig indgift af erythromycin og atorvastatin, lovastatin eller simvastatin kan ses hjertesvigt

Graviditet: Må anvendes, men bør så vidt muligt undgås i 1. trimester

Amning: Kan om nødvendigt anvendes.