

# Bucky-behandling

Bucky-behandling anvendes til behandling af kroniske hudsygdomme som psoriasis, eksem og kroniske kløetilstande (pruritus ani = analkløe), samt enkelte andre sjældne hudsygdomme. Bucky stråler er bløde røntgenstråler, der kun trænger få millimeter ind i huden og derfor ikke skader de underliggende væv. Bølgelængdeområdet ligger på grænsen mellem røntgen og ultraviolet lys.

## Fremgangsmåde

- Oplys inden behandling hvis du har nogle allergier eller bruger medicin. Nogen former for medicin kan øge hudens modtagelighed for Bucky-lys og medføre skade på huden.
- Hudområdet, der skal behandles, befries for skæl og hudskorper. Dette gøres med olie eller 5% salicylopløsning i hovebunden eller salicyl-salve eller creme på kroppen.
- Behandlingen kombineres med kortison-creme eller salve eller kortisonopløsning. På behandlingsdagen skal huden dog være tør og uden creme/salve.
- Behandlingen gives i en serie: ca. 1 gang om ugen i 4-6 uger
- Efter endt behandling ses en helende effekt
- Behandlingen kan gentages efter ½ år, hvis der forekommer tilbagefald

## Bivirkninger

- Der kan opstå en vis irritation og rødme i huden efter behandling
- En øget pigmentering kan opstå i det behandlede område, men dette kan mindskes ved at undgå sollys og solarie før og efter behandlingen, brug en solfaktor 40+ på området
- Bucky-behandling kan gives op til en vis dosis. Hvis denne overskrides, øges risikoen for hudcancer. Oplys derfor hvis du tidligere har modtaget behandling samt på hvilken klinik.

## Links

- <http://www.dandermpdv.is.kkh.dk/dds/infolders/psoriasis/psoriasis.pdf>
- <http://www.psoriasis.dk/psoriasis/bucky-strr>