

Dimethylfumarat tablet behandling

Skilarence indeholder det aktive stof dimethylfumarat, der hæmmer T-cellernes aktivitet i immunsystemet. Den inflammation, der ses i huden hos psoriasispatienter, hæmmes herved også. Derfor er Skilarence effektivt i behandling af plaque-psoriasis, der ikke kan behandles ved hjælp af salve.

Behandling

Inden behandlingsstart får du taget blodprøver til måling af immunceller, levertal, nyretal og hos kvinder også for at udelukke graviditet. Er tallene fine, udskrives en recept på Skilarence til 30 dage, og medicinen skal hentes på apoteket indenfor 7 dage. Der tages kontrolblodprøver hver måned i de første 3 måneder af behandlingen, og er resultaterne okay, tages der herfra kontrolblodprøver hver 3. måned under resten af behandlingen.

Skilarence tages i tabletter i forbindelse med et hovedmåltid, og skal sluges hele. Startdosis er på 30 mg 1 gang dagligt og dosis øges gradvist de første par måneder indtil den rette dosis er fundet i samråd med lægen. Normalt kan der ses en forbedring i løbet af de første 3 ugers behandling, og denne øges med fortsat behandling. Skilarence kan ikke kurere psoriasis, men der er tidligere vist en markant forbedring af tilstanden hos en gruppe patienter efter 16 ugers behandling.

Bivirkninger

- Diarré og mavesmerter
- Kvalme
- Rødmen i huden
- Nedsat aktivitet i immunforsvaret (dette tjekkes i kontrolblodprøverne)
- Nedsat appetit
- Hovedpine
- Opkastning
- Oppustethed og øget luft i tarmene
- Træthed
- Nedsat leverfunktion
- Svimmelhed
- Nedsat nyrefunktion ses i sjældne tilfælde (dette tjekkes i kontrolblodprøverne)
- Allergisk reaktion kan forekomme, kontakt da klinikken!

- Hjerneinfektionen Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) ses i meget sjældne tilfælde. Oplever du hukommelsestab, synstab eller problemer med at gå og tænke klart-stop da behandlingen og kontakt klinikken med det samme!

Forholdsregler

- Overfølsomhed overfor dimethylfumarat eller laktose-monohydrat (se indlægsseddel for fuld liste af indholdsstoffer i tabletterne)
- Du må ikke donere blod under og frem til 2 dage efter behandlingen
- Hvis du har svært nedsat nyre- eller leverfunktion bør du ikke tage Skilarence
- Gravide og ammende bør ikke tage Skilarence, da dette ikke er tilstrækkeligt undersøgt
- Ved infektion kontaktes klinikken og det kan være nødvendigt at holde pause eller stoppe behandlingen
- Ved svære mave-tarmgener kontaktes klinikken. Irritation af mave og tarm kan afhjælpes ved at spise og drikke rigeligt sammen med tabletten.