

Curettage/afskrabning

Formål:

Ved curettage ønsker man at fjerne et element fra huden (vorte/fedtvorte, solforhorning eller lignende), som er beliggende i overhuden. Metoden er hurtig og rigtig anvendt, vil den medføre mindst mulig ardannelse.

Udførelse:

Curettage foretages efter bedøvelse med injektion eller for visse små elementer i frysebedøvelse.

Lokalbedøvelse: Efter afvask med spritserviet/ desinficerende væske foretages injektion af lokalbedøvelse. Bedøvelsesvæsken indsprøjtes under og omkring det element, der skal fjernes, med en meget tynd kanyle. Der vil udover stiksmerten være en sviende smerte under indsprøjtningen af bedøvelsesvæsken. Området vil være bedøvet næsten umiddelbart efter indsprøjtningen.

Herefter foretages afskrabningen med et skelignende instrument, med meget skarpe kanter

Der vil ofte være en let sivende blødning fra såret, som standses ved at påføre lidt jernklorid med en vatpind og/eller let brænding med en lille elektrode.

Frysebedøvelse: Elementet sprayes med flydende kvælstof i nogle få sekunder.

Elementet fjernes som beskrevet ovenfor. Frysningen medfører en svie i huden og ved afskrabningen kan der også være en let smerte.

Man vil ikke kunne foretage standsning af sivblødning som ved lokalbedøvelse, idet det vil være smertefuldt. Afskrabning i frysebedøvelse foretages derfor kun hvis man ikke forventer blødning.

Såret dækkes til sidst med et plaster/plasterforbinding.

Efter operationen

Der vil meget sjældent være smerter efterfølgende blot en let ømhed.

Såret kan væske de første dage. Hvis der er tale om et tykt, gullig væske, kan der være tale om betændelse og lægen kontaktes.

Hvis der skulle opstå hævelse, rødme eller udtalt ømhed omkring såret kontaktes lægen.

Såret bør skylles med rent vand daglig og en desinficerende opløsning.

Såret dækkes med plaster indtil der dannes en tør skorpe.

Helingstiden vil afhænge af sårets størrelse og placering, men det vil typisk vare 2 uger indtil der er dannet en tør skorpe.

Ar

Alle operationer i huden selv fjernelse af små elementer vil kunne medføre en vis ardannelse.

Ved curettage vil arret oftest blot bestå af en lys plet, som i nogle tilfælde vil kunne forsvinde.

Man vil opnå det bedste kosmetiske resultat hvis arret beskyttes imod stærk sol den første sommer efter operationen

Svar:

Du skal ringe på klinikkens telefon/ eller få email koder til www.lægevejn.dk og skrive til os inden for 2 - 3 uger for at få svar på, hvad hudprøven viser.