

## Kønsvorter (kondylomer)

Kønsvorter er vorter, der kan være lokaliseret overalt på ydre kønsdele og ved anus, men også i skeden, på livmoderhalsen, i analkanalen og i urinrøret. I sjældne tilfælde kan de være lokaliseret i mundhule.

Vorterne forårsages af Human Papilloma Virus (HPV), og der kan gå måneder fra man bliver smittet, til de viser sig. De ses oftest hos teenagere/unge voksne.

### Om HPV

HPV er årsag til kønsvorter, livmoderhalskræft og analcancer.

Der findes over 100 HPV-typer, deraf er 40 i stand til at give kønsvorter, mens mindst 12 typer er kræftfremkaldende.

HPV smitter hovedsageligt ved seksuel kontakt, men kondylomer kan også overføres fra mor til barn ved fødslen. Størstedelen af seksuelt aktive personer får på et tidspunkt en HPV-infektion. Forekomsten er hyppigst i de unge år. 60-80% af alle kvinder bliver inficeret med HPV, men risikoen for livmoderhalskræft gennem livet er kun ~ 1%.

### HPV-vaccine

Den største effekt opnås ved at vaccinere børn i 10-13 års alderen. I børnevaccinationsprogrammet anvendes Gardasil til 12-årige piger. Vaccinen tilbydes også til unge kvinder.

Gardasil kan også anvendes til drenge/mænd, og forebygger analcancer samt kondylomer.

Hvis man allerede har celleforandringer, cancer eller kondylomer, har vaccinen ingen behandlingseffekt.

### Fremgangsmåde

Selve virus kan man ikke bekæmpe, men de synlige kondylomer kan behandles med:

1. Frysning ca. hver 3.-4. uge i en periode på op til et par år.
2. Derefter pensling med Podophyllin® Som vaskes af efter 4 timer  
(Må ikke anvendes til gravide)
3. Hjemmebehandling: Condylone® påføres vorterne 2 \* dagligt i 3 dage og derefter holdes 4 dages pause. Dette gentages til vorterne er forsvundet.

Virker ovenstående behandling ikke, kan der anvendes Aldara (Imiquimod) 5% (ikke til gravide)

### Links

- <https://www.ssi.dk/vaccinationer/boernevaccination/vaccination-mod->

[livmoderhalskraeft](#)

- <http://www.ouh.dk/wm362396>