

# Priktest

Formålet med denne instruks er at informere om brug af priktest til test for allergi overfor almindelige dagligdagsting som pollen og husdyr.

## Fremgangsmåde

Ved priktest lægger vi nogle dråber på din underarm med ekstrakt af det stof vi vil teste om du er allergisk overfor. Derefter prikker vi med en lille metalspids (lancet) gennem dråberne, så noget af stoffet kommer ind i det øverste lag af huden. Du vil kunne mærke prikket, men de fleste synes ikke det gør ondt.

## Hvis du er allergisk

Hvis du er allergisk over for nogle af de stoffer vi tester for, vil det vise sig som en lille hævelse i huden med kløe og rødme. Reaktionen kommer i løbet af 15 min. og minder om et myggestik, men hævelsen vil aftage i løbet af en times tid.

I alt varer undersøgelsen ca. ½ time.

## Forberedelse

- De sidste 2 uger op til priktesten må du ikke smøre dine underarme med creme eller salve, der indeholder binyrebarkhormon
- Den sidste uge op til testen må du ikke tage antihistamin i tabletform
- På test-dagen må du ikke bruge fugtighedscreme på underarmene
- Oplys venligst hvis du er gravid

## Efter testen

Efter testen kommer du til lægesamtale. I sjældne tilfælde kan der komme en allergisk reaktion i huden på et senere tidspunkt. Sker dette, skal du kontakte klinikken med det samme.

## Links

- <https://allergi.astma-allergi.dk/harduallergi/undersogelseforallergi>
- <https://www.videncenterforallergi.dk/allergi-og-eksem/haandeksem/haandeksem-1042/priktest/>