

Behandling af vorter med Canthacur

Behandling med Canthacur

Behandling med Canthacur er en gennemprøvet behandling til vorter og kan bruges, hvor anden behandling ikke virker.

Hvad er Canthacur?

Canthacur er en væske som medfører blæredannelse mellem over- og underhud, giver irritationsreaktion og derved hjælper med at afstøde vorten.

Behandlingen foregår altid her på klinikken og kan ikke bruges som hjemmebehandling.

Hvordan foregår behandlingen?

Canthacurvæsken smøres på vorten og der sættes plaster over.

Det er individuelt hvor mange timer Canthacur-væsken skal sidde på. Dette aftaler vi med dig.

Oftentimes er der mellem 2 - 6 timer. Du skal fjerne plastre, når du kommer hjem.

OBS! Hvis du får ondt, skal du straks fjerne plastret.

Når du kommer hjem

Når plastret er blevet fjernet skal du vaske området med vand og sæbe og hvis du har behov

Dække det til med et plaster. Hvis du får en blære, er det en god ide at prikke hul på den, da den kan spænde og gøre ondt. Blæren heler normalt op i løbet af ca. 8 dage.

Efterbehandling

Når blæren er helet, er det vigtigt, at du selv følger op på behandlingen ved at

Beskære vorten

Bruge vortemiddel

Vortemiddel (f.eks. Vortex) kan købes i håndkøb. Vi anbefaler, at du beskærer og smører vorten hver dag.

Vorten er væk. Når hudlinierne er gendannet. Det er vigtigt, at observere området for tilbagefald i nogle måneder.