

# Binyrebarkhormon-indsprøjtning

Formålet med denne instruks er at informere om brug af binyrebarkhormon til indsprøjtning i huden.

Denne behandling bruges til at behandle mange typer sygdomme, fx gigtlignende reaktioner i huden, pletvist hårtab og andre sygdomme i huden. Man udnytter her binyrebarkhormonets evne til at dæmpe betændelse.

## Fremgangsmåde

Binyrebarkhormon-indsprøjtning i huden ordineres af lægen og vi bruger præparatet kenalog®

Indsprøjtning direkte i huden gives for at hæmme en betændelsesreaktion med det samme. Lignende gælder ved visse typer gigtbetændelse i huden. Det er lægen eller sygeplejersken, der giver indsprøjtningen, og i nogle tilfælde vælger vi at sprøjte et lokalbedøvende middel (Lidokain) ind sammen med binyrebarkhormonet.

## Behandlingseffekt og antal behandlinger

Virningen af indsprøjtningen vil vise sig ved at huden bliver normal, og effekten kan vare fra få uger til flere år. Ofte vil behandlingen skulle gentages for at alle dele af huden bliver behandlet. Lægen/sygeplejersken vurderer hvor lang tid der skal være mellem indsprøjtningerne.

Hvis du ofte får indsprøjtninger, bliver din risiko for bivirkninger større.

## Bivirkninger

De fleste patienter oplever aldrig bivirkninger i forbindelse med indsprøjtning af binyrebarkhormon, men det kan forekomme:

- Din hud omkring indsprøjtningstedet kan ændre sig, huden kan fx blive tynd og pigmentet kan forsvinde, så huden bliver lysere. Dette vil dog blive normalt igen.
- Der kan opstå betændelse omkring indstiks-stedet. Det vil vise sig som hævelse, rødme og varme. Har du mistanke om betændelse, skal du kontakte klinikken eller vagtlægen.

## Links

- <https://www.gigtforeningen.dk/viden-om-gigt/behandlingsmuligheder/medicin/hurtigtvirkende-betaendelsesdaempende->

[midler/binyrebarkhormon/](#)